


WakeMed

Preparación para su Colonoscopia

Una colonoscopia es un examen del revestimiento de su intestino grueso. Se pasa un tubo flexible (colonoscopio) a través del recto hasta el colon. El médico buscará anomalías a través del colonoscopio. Si es necesario, se puede tomar una muestra de tejido (biopsia) durante el examen y enviarla para su análisis.

Fecha de Procedimiento_____
Hora de Llegada_____
Hora de Procedimiento_____
Fecha de Visita Pre-Operatoria_____
Hora de visita Pre-Operatoria_____
Ubicación de Visita Pre-Operatoria Raleigh Cary -O- Llamada de Enfermera Pre- Operatoria _____

Colorectal cancer can begin as a simple polyp. Undetected polyps may progress from being precancerous to cancerous. To help prevent the development of colorectal cancer, your physician may perform a colonoscopy procedure to find and remove polyps.



- Es posible que deba realizar una visita previa al procedimiento, según su historial de salud. Esto se programará en WakeMed Pre-Admission Testing, Raleigh Medical Park, 23 Sunnybrook Road, Suite 110, Raleigh, NC 27610
- Si no se necesita una visita previa al procedimiento, una enfermera lo llamará para revisar su historial médico y sus medicamentos.

Continuado→

Cinco Días Antes de su Procedimiento

- No tome productos que contengan aspirina (NSAID), pastillas de hierro o vitaminas que contenga hierro o medicamentos para la artritis.
- Si toma hasta 325 mg de aspirina de venta libre todos los días, puede continuar tomándola hasta el día de su procedimiento.
- Si tiene diabetes, deberá hablar con el médico que la ayuda a controlar su diabetes sobre cómo ajustar sus medicamentos antes y después de la colonoscopia.
- Si está tomando un anticoagulante como coumadin, Plavix, Pradaxa, Eliquis, Effient, Brilinta, etc., se le informará si debe suspender estos medicamentos y cuándo, una vez que recibamos la autorización de su médico de atención primaria o cardiólogo.

Tres Días Antes de su Procedimiento.

- No coma nueces, palomitas de maíz, brócoli o maíz.

Un Día Antes de su Procedimiento

LÍQUIDOS CLAROS ÚNICAMENTE EL DÍA ENTERO ANTES DE SU PROCEDIMIENTO – SIN COMIDA

- Beba líquidos claros el día anterior a su procedimiento hasta la medianoche. Los líquidos claros incluyen agua, bebidas carbonatadas, jugos claros sin pulpa (manzana o uva blanca), caldo de pollo, caldo de res, gelatina, paletas de hielo (no rojas ni moradas), té o café.
- NO tome leche, crema, jugo de naranja u otros líquidos o gelatina con pulpa y/o de color rojo, naranja, burdeos o morado. No tome alcohol.
- Si tiene diabetes, ajuste sus medicamentos para diabetes de acuerdo con las instrucciones de su médico.

La NOCHE antes de su procedimiento – Preparación Intestinal

- A las 6 pm la noche anterior a su procedimiento, tome la primera parte de su preparación intestinal. Hay varias opciones de preparación intestinal. Solo se ordenará y recetará UNA preparación intestinal para usted. La preparación intestinal que se ordene para usted dependerá de la cobertura de su seguro y de la preferencia del médico.
- Siga las instrucciones a continuación para la preparación intestinal que recetó su médico.

SUPREP

La noche anterior a su procedimiento: A las 6 pm, vierta el contenido de una botella de SUPREP en el recipiente para mezclar provisto, llene el recipiente con agua hasta las 16 oz. Llene la línea y beba toda la cantidad. En un periodo de una hora, beba dos recipientes de agua adicionales de 16 oz.

El día de su procedimiento: Seis horas antes de su procedimiento programado (o 4 am si el procedimiento es antes de las 10 am), vierta el contenido de la segunda botella de SUPREP en el recipiente provisto, llene la línea y beba toda la cantidad. En un periodo de una hora, beba dos recipientes de agua adicionales de 16 oz.

Continuado→

SUTAB

La noche antes de su procedimiento: A las 6 pm, llene el recipiente con 16 oz. De agua, abra una botella de tabletas (total 12) y tome cada tableta con un sorbo de agua. Beba toda la 16 oz. de agua durante 15 a 20 minutos. Después de una hora, beba otra 16 oz. de agua durante 30 minutos. Después de 30 minutos, beba otras 16 oz. de agua durante 30 minutos.

El día de su procedimiento: Seis horas antes de su procedimiento programado (o 4 am si el procedimiento es antes de las 10 am), llene el recipiente con 16 oz. de agua, abra el segundo frasco de tabletas (total 12) y tome cada tableta con un sorbo de agua. Beba todas las 16 oz. de agua durante 15 a 20 minutos. Después de una hora, beba otra 16 oz de agua durante 30 minutos. Después de 30 minutos, beba otras 16 oz de agua durante 30 minutos.

GoLYTLEY

La noche anterior a su procedimiento: Justo antes de las 6 pm, llene el recipiente provisto con agua hasta la línea de llenado y mezcle el contenido del recipiente. A las 6pm, beba 8 oz. de la mezcla cada 15 minutos hasta terminar la mitad del contenido del recipiente. Refrigere el resto.

El día de su procedimiento: Seis horas antes de su procedimiento programado (o 4 am si su procedimiento es antes de las 10 am), beba 8 oz. de su GoLYTLEY restante cada 15 minutos hasta que termine todo.

CLENPIQ

La noche antes de su procedimiento: A las 6 pm, tome la primera dosis (1 botella) de CLENPIQ. No se requiere mezclar. Entonces beba cinco vasos de 8-oz. (vaso incluido) de líquidos claros (40 oz. En total) dentro de las cinco horas antes de acostarse.

El día de su procedimiento: Seis horas antes de su procedimiento programado (o 4 am si su procedimiento es antes de las 10 am), beba la segunda botella de CLENPIQ. Luego, beba al menos tres vasos de 8 oz.(vaso incluido) de líquidos claros (24 onzas) al menos dos horas antes de la colonoscopia.

PLENVU

La noche antes de su procedimiento: A las 6 pm, vierta el contenido de la Dosis 1 (1 paquete) en el recipiente para mezclar con 16 oz. de agua. Revuelva o agite hasta que se disuelva y beba dentro de los 30 minutos. Vuelva a llenar el recipiente de mezcla con 16 oz adicionales de agua y beber durante los siguientes 30 minutos.

El día de su procedimiento: Seis horas antes de su procedimiento programado (o 4am si el procedimiento es antes de las 10 am), vierta el contenido de la Dosis 2 (2 paquetes, A y B) En el recipiente para mezclar con 16 oz. de agua. Revuelva o agite hasta que se disuelva y beba dentro de los 30 minutos. Vuelva a llenar el recipiente de mezcla con 16 oz adicionales de agua y beber durante los siguientes 30 minutos.

Instrucciones adicionales para el día de su procedimiento

Estas instrucciones son para todos los pacientes sin importar el tipo de preparación intestinal que esté usando.

Continuado→

- Seis horas antes de la hora programada para su procedimiento (o 4 am si su procedimiento es antes de las 10 am), comenzará la segunda parte de su preparación intestinal.
- **No coma ni beba nada el día del procedimiento, excepto su preparación intestinal.**
- **Si tiene medicamentos que debe tomar, puede tomarlos con un sorbo de agua.**
- Debe tener a alguien mayor de 18 años con usted para firmar su salida, llevarlo a casa y ser responsable de su cuidado posterior.
- Por favor traiga su identificación con foto, tarjeta de seguro, una lista de sus medicamentos y cualquier copago requerido.
- Si su procedimiento está programado en **WakeMed Raleigh Campus**, llegue para su procedimiento al Andrews Center, Oficina de endoscopia, Suite 101 (primer piso) en 3024 New Bern Avenue.
- Si su procedimiento está programado en **WakeMed North Hospital**, llegue para su procedimiento a la entrada de cirugía ambulatoria de WakeMed North Hospital, 10000 Falls of Neuse Road.
- Si su procedimiento está programado en **WakeMed Cary Hospital**, llegue 2 HORAS antes de su procedimiento a la entrada principal de WakeMed Cary Hospital en 1900 Kildaire Farm Road y busque Registro de pacientes. Lo dirigirán a Endoscopia, 1er piso.
- Si su procedimiento es en **Triangle Endoscopy Center**, llegue para su procedimiento a la Suite 100 en 2600 Atlantic Avenue.

La aplicación WakeMed proporciona indicaciones paso a paso hacia y dentro de nuestras instalaciones. Envíe un mensaje de texto con la palabra "WakeMed" al 888111 o visite wakemed.org/allaccess para descargarlo.

La mejor manera de comunicarse con nosotros es a través de MyChart si tiene preguntas. Si no tiene una computadora en casa o un teléfono celular para acceder a MyChart, llámenos al 919-350-5318.